

ENVIREX +

Bruksfärdigt pulver endast för professionellt bruk
DESINFEKTIONSMEDEL TORKPULVER BASERAT PÅ MINERALKOMPLEX
FÖR HYGIEN I STRÖ
NÖTKREATUR, GRISAR OCH FJÄDERFÄ
BIOCIDPRODUKTER

verksamma ämnen per 100 g produkt: Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)bis(sulfat) 0,9g
+Troklosennatrium 0,05g

HUVUDGRUPP 1: Desinfektionsmedel och allmänna biocidprodukter; Produkttyp 3:

Hygienbiocidprodukter för veterinärverksamhet

PRESENTATION

- . Pulver, Beige
- . Absolut pH-värde: Ej disponibel
- . pH-värde vid 10 g/l: $8 \pm 0,5$
- . Densitet vid 20°C: 1 g/cm³
- . Fryspunkt: Ej disponibel

EGENSKAPER

- Byggnader för fjäderfä, grisar och idisslare
- Desinificerande pulver: består till 2% vikt/vikt av VIREX
- Fräsch vårdoft: långvarig doft tack vare doftämnets pulverform
- Fångar lukt: hög reduktion av ammoniaklukt
- Lätt att sprida på marken: fastnar inte på användarens händer eller på juver eller strö

-Starkt absorberande kapacitet: Kaolin är ett effektivt torkningsmedel som möjliggör hög fuktkontroll

ENVIREX + har visats absorbera mer än 120% av sin egen vikt, vilket innebär att den absorberar nästan 3 gånger så mycket som kalk.

ANVÄNDNING

Instruktioner för användning:

Fördela på ytan för hand eller mekaniskt, fyll på regelbundet:

NÖTKREATUR:

- Djup strö som områden med halm: applicera efter att halmen har strötts ut:
Dos desinficeringsmedel: 300 g/m² 2-3 gånger per vecka
- Bås: 300 g/m² 2-3 gånger per vecka (över båssets bakre tredjedel)
- Kalvningsbox: Applicera 300g/m² på golvet efter rengöring
- Kalvavdelningar och -boxar: Applicera 300g/m² på golvet efter rengöring, därefter 1 applicering/vecka när du ströar

GRISAR:

- Uppfödning: applicera till strö, sprid dagligen ut i kulingarnas sovområden samt på värmedynor: 300 g/m² varannan dag (grisning: Strö ut på kulingar för att torka och värma nyfödda)
- Gödning: 300 g/m² per vecka i fuktiga områden

Produkt: **ENVIREX +**

Uppdaterat: 02/11/20

version 1.5

FJÄDERFÄN:

Lämplig för alla arter: sprid ut 300 g/m² 4 dagar innan fåglarna anländer, när strö byts ut och innan utrustning installeras.

- Kalkon: 300 g/m² varje vecka från vecka 2 till vecka 10
- Gödkycklingar: 300 g/m² varje vecka från vecka 1 till vecka 5
- Ankor: 300 g/m² varannan dag från födseln

FÖRPACKNING

Säck 25kg

BigBag 1000l 1000kg

Använd produkten inom 24 månader från tillverkningsdatum.

Förvaras på ren, ventilerad plats, åtskilt från värmekällor och starkt ljus.

SÄKERHET

Se det säkerhetsdatablad som finns tillgängligt på INTERNET: <http://www.kersia-group.com>

LAGSTIFTNING

Använd biocider på säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

För desinfektionsmedlen har följande effektivitetstest utförts i enlighet med gällande normer

Effektivitet

Aktivitet	Standard	Testade organismer	Interfererande substans	Kontaktid:	Temperatur:	Koncentration:
Bakteriedödande medel	Adapted protocol of EN 14349 standard	Enterococcus hirae, Proteus hauseri, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt	120min	10°C	300 g/m2
					30°C	300 g/m2
		Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Streptococcus uberis, Campylobacter jejuni	10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt	120min	10°C	300 g/m2
					30°C	300 g/m2